

***Ancistrochilus rothschildianus* (O'Brien)**



Etymologie :

Grieks : "ankistron" wat staat voor haak en daar verwijst men naar de teruggelooide scherpe middenlob van de lip. "Cheilos" = lip. Synoniem = *Ancistrochilus thompsonianus* var. *gentilii* De Wildeman

Beschrijving :

Plant groeit epifytisch. Groeit in gematigd tot warme streken van 500 tot 1100 meter hoogte. Op dikkere horizontale takken, waarop een laag korstmossen is ontwikkeld, welke het vocht helpen vasthouden. De dunne wortels nestelen zich onder het korstmos door op de schors van de bomen. De lancetvormige bladeren zijn zacht en in langsrichting geneefd en zitten bovenop de afgerijpte bulben.

Kweekwijze :

Dag temperaturen, warm tot zeer warm $\pm 25^{\circ}\text{C}$, nacht temperaturen $\pm 20^{\circ}\text{C}$ Afwisselend zeer hoge luchtvochtigheid en drogere periodes. Veel licht. In onze late nazomer een drogere rustperiode. Naast de bulben ontspruiten scheuten, nog niet te snel gieten, zoniet treedt rot op. De bulben laten uitrijpen tot dikke knollen, matig bemesten in de groeiperiode. Zodra de knollen volgroeid zijn, watergift iets verminderen. Onderaan de bulben ontspruiten opnieuw scheuten, slanker en met wat gezwollen top. Hieruit ontwikkelen een drietal bloemen.

Opmerkingen :

De bulben verliezen hun blad en schrompelen enigsinds in. Ze lijken dan in elkaar te zakken. De plant ontwikkeld vaak meerdere scheuten op een bulb. Op die manier kan je de plant vegetatief vermeerderen. Niet te snel scheuren. De oude bulben helpen mee met de ontwikkeling van nieuwe scheuten. Scheuren en verpotten tijdens rustperiode. Als de wortels worden beschadigd ontstaat grote groeiachterstand.

Verspreidingsgebied :

Kameroen, Kongo, Gabon, Guinea, Ivoorkust, Liberia, Nigeria, Sierra Leone, Oeganda.

Copyright © 2008 P & P Orchids /O.V.V., alle rechten voorbehouden.

