



Angraecum chevalieri (Summerhayes)

Etymologie :

Afgeleid van het Maleisisch "ANGUREK" = epifytische orchidee. Genoemd naar A. Chevalier, een Franse orchideeënverzamelaar uit de 19de eeuw.

Beschrijving :

Vertakte stam die 15cm lang kan worden. De wortels die langs de hele stam tevoorschijn komen, zijn 2mm dik. De bladeren groeien in twee rijen aan de bovenste helft van de stam en zijn smal, licht vleesachtig, 3-5cm lang en 0,5 -0,7cm breed. Bloemstengels komen boven de bladeren tevoorschijn en dragen 1 tot 2 bloemen. Lip naar boven gericht en de middelste sepaal naar beneden gericht. Kleur is groenachtig tot stro-achtig. Sepalen 0,8-1,6cm bij 0,1 tot 0,2cm. Petalen iets korter en iets smaller en naar achteren gericht. Lip = 0,7 tot 1,1cm bij 0,3cm en staat hol. Spoor 1,5 - 2cm lang en heeft een lichte S-vorm.

Verspreiding:

Kameroen, Gabon, Guinea, Equatoriaal Guinea, Ivoorkust, Liberia, Nigeria, Tanzania, Uganda, Congo



Habitat :

Tropisch regenwoud, tussen de 1100-1200m.

Cultuurvoorwaarden:

Opgebonden op een stukje kurk, in een schaduwrijke, vochtige omgeving, gematigde temperatuur. Deze niet echt spectaculaire soort wordt nogal veel teruggevonden in collecties. De planten haten het gedeeld te worden.

Opmerking:

Deze soort kan dezelfde zijn als *A. moandense* (De Wildeman). Indien dit inderdaad zo is, blijkt *A. moandense* de correcte naam te zijn.

Copyright © 2008 P & P Orchids /O.V.V., alle rechten voorbehouden.

